



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES



BRETAGNE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 1 du 18 mai 2000 - 1 page

Désherbage

Pour améliorer l'efficacité du désherbage et préserver la qualité de l'eau, un suivi des mauvaises herbes est mis en place en Bretagne.

Il a pour but de pouvoir préconiser à titre expérimental en 2000 des interventions ciblées sur les adventices selon leur stade de développement avec des herbicides au meilleur profil environnemental.

Cette opération réalisée en commun entre :

- la DRAF-SRPV

- et la FE.RE.DEC de Bretagne

bénéficie du soutien du Conseil Régional de Bretagne.



Les informations seront reprises dans le bulletin d'avertissement agricole et disponibles sur le site Internet : <http://draf.bretagne.agriculture.gouv.fr>



Prochain
numéro le 25
mai 2000

Observations sur le maïs

Pour les semis de la première semaine de mai, les observations dans le bassin rennais indiquent un état de la flore adventice suivant :

Dicotylédones :

Chénopode blanc et stellaire (parfois appelée mouron blanc), stade cotylédons déployés à premières feuilles.

Renouée des oiseaux, stade première feuille.


Mercuriale, stade cotylédon déployé.

Graminées :


Les graminées de type P.S.D. (Panic, Sétaire, Digitaire) et pâturin, stade 1-2 feuilles (hauteur 1-2 cm).

Préconisations

Pour les stratégies de désherbage sans intervention de présemis ou prélevée, les traitements ciblés sur les adventices ci-dessus sont à prévoir la semaine du 22 au 29 mai.



Chénopode au stade cotylédons



Stellaire



Mercuriale

Renouée des oiseaux



Traitements ciblés
du 22 au 29 mai.



741

DRAF Bretagne
Service Régional de la
Protection des Végétaux
B.P. 60116
35701 RENNES CEDEX 7

Imprimé à la station
D'Avertissements Agricoles
de Rennes
Directeur gérant :
P. BLANCHET
Publication périodique
C.P.A.P. n°528 AD
ISSN n°1167-2382